

刺激に弱い乾燥肌のかゆみ治療薬

—かゆみ・皮膚炎に—

(販売名) 近江兄弟社メンタームEXソフト


90g

乾燥性皮膚や乾皮症などの皮膚病は、がまんできない不快なかゆみを伴います。

空気の乾燥する冬場、入浴後や就寝時の体が暖まった時などにかゆみがひどくなるのが特徴で、かくとますますかゆくなり悪化してしまいます。

近江兄弟社メンタームEXソフトは、かゆみ止め成分・ジフェンヒドラミン塩酸塩、リドカインがすばやくかゆみを抑え、グリチルレチン酸が肌の炎症を抑えます。さらに、低刺激性保湿成分が、かゆみやカサカサの原因である乾燥肌にうるおいを与え、トコフェロール酢酸エステルやパンテノールが血行をよくして、なめらかな肌へ導きます。

カサついて、かゆい肌には**乾燥対策**と**かゆみ対策**が必要です。



■ 刺激に弱い乾燥肌のこんな症状に

<p>がまんできない!</p>	<p>かゆくてイライラ!</p>	<p>肌がカサカサ</p>	<p>眠れない!</p>
小児のカサつく肌に	老人のカサつく肌に	成人のカサつく肌に	体が暖まるとかゆい!

・下着の締めつけ、こすれで起こる皮膚炎にも

(→裏面に続きます。)

△ 使用上の注意

⊗ **してはいけないこと**〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕

次の部位には使用しないでください。

創傷面、目の周囲、粘膜等



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位

症状

皮膚

発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

かゆみ、皮膚炎、かぶれ、しっしん、じんましん、あせも、しもやけ、虫さされ、ただれ

用法・用量

1日数回、患部に適量を塗布してください。

次の注意事項を守ってください

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

成分・分量〔100g中に次の成分を含みます。〕

成分	分量	働き
ジフェニヒドラミン塩酸塩	2.0g	皮膚のかゆみをしずめます。
リドカイン	2.0g	皮膚のかゆみをしずめます。
グリチルレチン酸	0.2g	炎症をおさえます。
パンテノール	1.0g	肌の正常な働きを助けます。
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	血行を促進し、症状の回復を早めます。

添加物として、セトステアリルアルコール、白色ワセリン、ミリスチン酸イソプロピル、ミリスチン酸オクチルデシル、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ジメチルポリシロキサン、プロピレングリコール、グリセリン、メチルパラベン、プロピルパラベン、カルボキシビニルポリマー、キサンタンガム、エデト酸Na水和物、2,2',2"-ニトロロトリエタノールを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温・直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

お問い合わせ 株式会社 近江兄弟社 お客様相談室 TEL.0748-32-3135
※受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/>
(フリーダイヤル) 0120-149-931

製造販売元 株式会社 近江兄弟社 滋賀県近江八幡市魚屋町元29