

ご使用に際してこの添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品


## 乾燥性皮膚治療薬

(販売名) 近江兄弟社メンタームHPプラス

### 特徴

- 有効成分「ヘパリン類似物質」を0.3%配合した乾燥肌の治療薬です。
- ヘパリン類似物質の皮膚保湿・血行促進・抗炎症作用で、乾燥肌、角化症に効果があります。さらに有効成分として皮膚組織の修復を促す「アラントイン」、血行を促進し症状の回復を早める「トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)」を配合しています。
- カバー力、保湿力に優れ、お肌をしっとり保護。のびがよく、べたつきにくい油性タイプのクリームです。

### 4つの作用で乾燥肌を改善



保湿成分

スクワラン、ヒアルロン酸Na、ワセリン、グリセリン配合

### しみない!お子様にも

非ステロイド

エタノールフリー

尿素無配合

無香料

無着色

(→裏面に続きます。)

## △ 使用上の注意

☒ **してはいけないこと** [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります]

次の人は使用しないでください。

- (1) 出血性血液疾患（血友病、血小板減少症、紫斑病など）の人。
- (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。  
（血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります）



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 効能・効果

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ（ただれを除く）、さす・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり（顔面を除く）、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

## 用法・用量

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼ等のにぼして貼ってください。

### 次の注意事項を守ってください

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3) 外用にのみ使用してください。\*出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなることがあります。)\*顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。(4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

## 成分・分量 [100g中に次の成分を含みます。]

成分	分量	働き	添加物：グリセリン、流動パラフィン、スクワラン、プロピレングリコール、ワセリン、グリセリン脂肪酸エステル、セレシン、パラベン、エドト酸Na、ヒアルロン酸Na
ヘパリン類似物質	0.3g	血行促進・皮膚保湿作用があり、乾燥肌、角化症に効果があります。	
アラントイン	0.2g	皮膚組織の修復を促します。	
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE)	0.5g	血行を促進し、症状の回復を早めます。	

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。(2) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。(3) 小児の手の届かないところに保管してください。(4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

## お問い合わせ 株式会社 近江兄弟社

お客様相談室 TEL.0748-32-3135

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

発売元 株式会社 近江兄弟社 滋賀県近江八幡市魚屋町元29

製造販売元 万協製薬株式会社 三重県多気郡多気町五柱1169-142

副作用被害救済制度のお問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/>

(フリーダイヤル) 0120-149-931